وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۲/۴۰/۹۱۶۵۶
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
پیوست

مدیرکل محترم دامپزشکی استان

موضوع نامه: « استفاده از فرمالین در صنعت پرورش طیور »

با سلام و احترام ،

با عنایت به استعلام برخی استان ها در خصوص استفاده از فرمالین در صنعت پرورش طیور و طرح موضوع در کارگروه تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های خام دامی مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ و ۹۲/۱۰/۲۳ ، بدین وسیله موارد زیر جهت استحضار ایفاد می شود :

۱. به منظور افزایش تاثیر گذاری و نیز پیشگیری از بروز مقاومت های باکتریایی، انجام عملیات ضدعفونی با استفاده از مواد شیمیایی در صنعت طیور باید به بهره گیری همزمان از چند نوع ماده ضدعفونی کننده دارای خاصیت هم افزایی (سینرژیستی) صورت پذیرد. به عبارت دیگر به کارگیری یک ماده ضدعفونی منفرد توصیه نمی شود.

۲. در صورت استفاده از فرمالین جهت ضدعفونی مواد اولیه و خوراک آماده دام و طیور رعایت موارد زیر الزامی است :

۲.۱. مصرف فرمالین باید براساس تجویز دکتر دامپزشک واجد شرایط و زیر نظر مسئول فنی بهداشتی واحد صورت پذیرد.

۲.۲. فرمالین مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت مربوط (ضدعفونی مواد اولیه و خوراک آماده دام و طیور) از سازمان دامپزشکی کشور باشد .

۲.۳. میزان مصرف فرمالین(فرمالدئید۳۷ درصد) حداکثر۲/۵ کیلوگرم در تن (مواد اولیه و خوراک آماده دام) می باشد.

۲.۴. شیوه های استفاده:

۲.۴.۱.اسپری و دود دادن (Fumigation) که عمدتا جهت ضدعفونی مواد اولیه و خوراک آماده دام موجود در انبار قابل استفاده می باشد .

۲.۴.۲.مخلوط کردن با دان که عمدتا بصورت پودری و یا بصورت مایع (اسپری)درمرحله میکسچر به خوراک آماده اضافه می شود.

۲.۵. احتیاطات مصرف:

۲.۵.۱. از مصرف فرمالین در خوراک حاوی اجرام زنده (از قبیل پروبیوتیک ها، پره بیوتیک ها، آنزیم ها و ...) خودداری شود .

۲.۵.۲.نحوه استفاده بایستی به نحوی انجام شود که فرمالین بصورت یکنواخت (همگن) با مواد اولیه و یا خوراک آماده مخلوط شود.

تهران خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (دوراهی یوسف آباد)
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ کدپستی: ۱۴۳۱۶۸۳۷۶۵
تلفن: ۳- ۸۸۹۵۳۴۰۰ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۹۶۲۳۹۲- ۸۸۹۵۷۲۵۲ (۰۲۱)
Website: WWW.IVO.IR
Email: Info@ivo.ir

۲.۵.۳. به منظور تاثیر کامل ماده ضدعفونی کننده ، مصرف دان آغشته به ترکیبات ضدعفونی کننده باید پس از ۲۴ ساعت مصرف شود.

۲.۵.۴. با توجه به اثرات فرمالین بر روی ویتامینهای گروه B خوراک، تنظیم میزان این ویتامین ضروری است .

۲.۵.۵. رعایت نکات ایمنی فردی (از جمله استفاده از ماسک ، عینک و ...) در زمان استفاده از فرمالین الزامی است .

دکتر محسن مشکوه
معاون بهداشتی و پیشگیری

رونوشت :

- معاون محترم تشخیص و درمان جهت استحضار
- مدیرکل محترم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی جهت استحضار
- مدیرکل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم جهت استحضار
- مدیرکل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی جهت استحضار