

## پنج بیماری کشنده در سگ و عوامل مؤثر در حفظ سلامت عمومی حیوان

صاحبان سگ‌ها باید حیوان خود را در اولین فرصت ممکن در مقابل این پنج بیماری حفاظت کنند:

۱. دیستمپر
۲. سخت شدن پنجه‌ها
۳. تورم کبد ویروسی
۴. یرقان لپتوسپیرایی
۵. عفونت پاروا ویروسی

برنامه عادی برای معاینه، واکسیناسیون و حفظ سلامت عمومی حیوان بایستی به شرح زیر باشد:



### شش هفتگی

توله را نزد دامپزشک ببرید. او حیوان را از نظر کک، شپش، جرب‌های گوش و هر ناهنجاری آشکاری مانند فتق یا برگستگی پلک‌ها به داخل (انتروپيون) به دقت معاینه می‌کند؛ در صورتی که هر یک از این موارد وجود داشته باشد، به شیوه‌ی مناسبی با آن‌ها برخورد خواهد کرد:

- انگل‌ها را درمان و زمان مناسبی برای تصحیح نقایص پیشنهاد می‌کند؛

- دقت در تغذیه را توصیه خواهد کرد؛

- داروی ضد کرم را به حیوان می‌خوراند و در همان موقع داروی نوبت دوم را نیز نسخه می‌کند تا ده روز بعد خورانده شود؛

- اگر کم‌ترین تردیدی در این مورد که توله کاملاً در منزل یا باغ صاحب خود محصور است وجود داشته باشد، دامپزشک واکسن سرخک را به داخل عضله توله تزریق خواهد کرد. واکسن سرخک ایمنی بسیار خوبی علیه دیستمپر و سختی پنجه‌ها ایجاد می‌کند ولی این ایمنی تنها چند هفته دوام می‌یابد و نباید از آن انتظار محافظت همیشگی را داشت.

- واکسن پاروا ویروس رانیز می‌توان در این مرحله تجویز کرد؛ ولی در این صورت بایستی تزریق دوم در سن ۱۵ هفتگی انجام شود.

## نه هفتگی

این سن زمان مناسبی برای دومین مراجعه به دکتر دامپزشک است و شاید مهم‌ترین زمان در زندگی توله سگ باشد. در صورت سالم بودن توله، دامپزشک نخستین نوبت واکسن ترکیبی دیستمپر و سختی پنجه‌ها، لپتوسپیروا و تورم کبد را تزریق خواهد کرد. او همچنین به شما خواهد گفت که حیوان را تا زمانی که تزریق دوم انجام نشده است، جدا از سگ‌های دیگر نگاه دارید. چنانچه توله در نه هفتگی تب داشته باشد یا سرفه کند یا دچار اختلال گوارشی باشد، دامپزشک پیش از تلقیح واکسن، این عوارض را معالجه و درمان خواهد کرد.

## ۱۱-۱۲ هفتگی

یک بار دیگر به دکتر دامپزشک که حالا با شما آشنا شده است مراجعه کنید. این مرتبه او واکسن یادآور را علیه لپتوسپیروز تجویز و توله را کاملاً معاینه خواهد کرد تا مطمئن شود کلیه ناهنجاری‌هایی که در هفته‌ی ششم وجود داشته کاملاً از میان رفته‌اند.

## ۱۵ هفتگی

واکسن پاروا و ویروس تزریق می‌شود.

## شش ماهگی

در این سن یک بار مراجعه‌ی دیگر به دامپزشک بسیار مناسب خواهد بود. او دهان توله را معاینه خواهد کرد تا مطمئن شود دندان‌های همیشگی به درستی جایگزین دندان‌های شیری شده‌اند و شاید جرم‌گیری منظم دندان‌ها را برای پیشگیری از پوسیدگی آن‌ها پیشنهاد کند. او در همین زمان وضعیت عمومی حیوان را بررسی و رژیم غذایی مناسب و فعالیت جسمانی روزانه را یادآوری خواهد کرد.

## سالانه

اگرچه بعضی از واکسن‌های جدید برای دوسال ایمنی ایجاد می‌کنند ولی بهترین کار این است که هر ۱۲ ماه یک تزریق یادآور علیه بیماری‌های کشنده صورت گیرد. مراجعه برای تزریق واکسن یادآور، به دامپزشک شما این فرصت را می‌دهد که سلامت عمومی حیوان را بررسی و توصیه‌هایی را در مورد دندان‌ها، انگل‌ها، اضافه وزن و غیره یادآوری کند؛ بنابراین در مجموع اگر شما این برنامه‌ی ساده‌ی پیشگیری را با دقت انجام دهید، مطمئناً عمری طولانی را بدون ابتلا به بیماری‌های کشنده، که هر یک از آن‌ها حداقل یک ناخوشی طولانی و خطرناک را ایجاد می‌کنند، به حیوان خود هدیه خواهید داد.

در حقیقت علی‌رغم دسترسی ما به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک‌های جدید، درمان دیستمپر، سختی پنجه‌ها، تورم کبد و لپتوسپیروز، به ندرت موفقیت‌آمیز است. پاروا و ویروس را می‌توان در سگ‌های بالغ درمان کرد ولی در توله‌ها معمولاً کشنده است.

ویرایش: پرتال آموزش و ترویج سازمان دامپزشکی کشور

منبع: سایت علمی دانشجویان ایران