

## بیماری تب دره ریفت

### - تعریف :

تب فونریزی دهنده دره ریفت یک عفونت ویروسی در حیوانات اهلی است که انسان را نیز بطور اتفاقی مبتلا می‌کند و باعث بیماری شدید با مرگ و میر بالا می‌گردد.

### ۲- راه انتقال بیماری در دام :

ویروس بیماری توسط پشه منتقل می‌شود. گاز گرفتن و انتقال از طریق شیر نیز ممکن است در عفونت حیوانات نقش داشته باشد.

### ۳- راه انتقال بیماری در انسان :

روش اصلی انتقال بیماری به انسان تماس با نسوج حیوانی آلوده در فلان کشتار و تهیه مواد غذایی و در مین بررسیهای آزمایشگاهی است.

### - ۴- عل نم بیماری در انسان :

۲ تا ۶ روز پس از ورود ویروس به بدن علائم بطور ناگهانی بروز می‌کند که چهار حالت متفاوت دارد.

(الف) در عمده موارد با تب، دردهای عضلانی و علائم غیر اختصاصی تظاهر می‌کند .

(ب) در موارد اندکی تب فونریزی دهنده خصوصاً با درگیری کبدی بروز می‌کند.

(ج) در ۱۰٪ موارد عوارض ثانویه چشمی

(د) در موارد نادر آنسفالیت دیده می‌شود.

### ۵- کنترل و پیشگیری :

-کسانیکه با حیوانات سر و کار دارند باید از تماس با فون یا بافت حیواناتی که ممکن است آلوده باشند خود داری کنند.

-از فریداری گوشت فاقد مهر دامپزشکی خود داری نمایید و گوشت و آلایش فریداری شده را حداقل به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کرده و هنگام فرد کردن آن از دستکش استفاده کنید.

**روابط عمومی و آموزش و ترویج اداره کل دامپزشکی استان گلستان**